

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
Département des urgences sanitaires

EBOLA – récapitulatif
22.08.2014

Une épidémie de maladie à virus EBOLA touche actuellement l’Afrique de l’Ouest : Guinée, au Liberia, à la Sierra Leone et au Nigeria.

- **Il n’y a, à ce jour, aucun cas d’Ebola diagnostiqué hors d’Afrique.**

TRANSMISSION

Le virus Ebola se transmet d’homme à homme par **contact direct** avec un liquide :

- des fluides corporels tels que le sang, la salive, l’urine, le lait maternel, le sperme, la sueur, les selles et les vomissements des personnes infectées, vivante ou non ;
 - des objets (comme des aiguilles souillées) qui ont été contaminés par les fluides corporels de patients infectés malades.
- **Il n’y a pas de transmission du virus :**
 - avant l’apparition de symptômes
 - ou s’il n’y a pas de contact physique (accueil, lieu public...) avec un malade
 - ou par l’échange d’argent ou de marchandises (hors viande de brousse).

SYMPTOMES

- Apparition brutale d’une fièvre élevée (> 38,5° C),
- douleurs articulaires, musculaires,
- maux de tête,
- importante fatigue générale.

En 3 à 4 jours, apparaissent d’autres symptômes au niveau de la peau et des muqueuses (conjonctivite, éruption cutanée, difficulté à avaler) et digestifs (diarrhée, vomissements).

QUELLE CONDUITE ADOPTER FACE A UNE PERSONNE QUI POURRAIT ETRE PORTEUSE DU VIRUS EBOLA ?

Cas 1 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria ou de la Sierra Leone, depuis **plus** de 21 jours

- **Aucune mesure spécifique.**

Cas 2 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria ou de la Sierra Leone, depuis **moins de 21 jours** et ne présente pas de fièvre ni de symptôme.

Il lui est conseillé de surveiller sa température pendant 21 jours et d’appeler le SAMU-CENTRE 15, en cas d’apparition de symptômes.

- **Aucune autre mesure spécifique.**

Cas 3 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria ou de la Sierra Leone, depuis **moins de 21 jours** **ET** présente une **fièvre supérieure à 38,5°C** (voire d’autres symptômes).

- Cette personne est définie comme un « cas suspect ».
- Il convient alors d’**APPELER LE SAMU-CENTRE 15** et en attendant :
 - Isoler la personne dans un espace clos,
 - Demander à la personne de porter si possible un masque chirurgical (ou au minimum un mouchoir) couvrant la bouche et le nez pour éviter la propagation de gouttelettes,
 - Limiter le nombre de personnes présentes à proximité,
 - Eviter tout contact physique avec la personne et se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique.