




# Mon enfant s'est fait piquer ?

## Guêpes, abeilles, bourdons et frelons



Dans la majorité des cas, les piqûres de guêpe, d'abeille, de bourdon ou de frelon provoquent une réaction locale. Chez certaines personnes, elles peuvent déclencher des réactions toxiques et/ou allergiques, pour lesquelles une hospitalisation peut être nécessaire.






### J'observe

 Une piqûre sur une zone du corps de mon enfant.

- **Piqûre dans la bouche ou dans la gorge avec difficultés à respirer.** Je donne un glaçon à sucer, si j'en ai à disposition, pour faire diminuer l'œdème et je consulte en urgence ;
- **piqûres multiples** (plus de 4 piqûres simultanées chez un enfant) - risque toxique du venin ;
- **signes d'allergie au venin de guêpes, d'abeilles, de frelons ou de bourdons** se traduisant par l'apparition d'un ou plusieurs symptômes suivants :
  - une difficulté pour respirer ou avaler ;
  - un **gonflement de la langue, des lèvres, de la gorge** ou des yeux ;
  - des étourdissements, un malaise ou une **perte de connaissance** ;
  - des nausées, des vomissements, une diarrhée ;
  - une éruption cutanée (**urticaire**) généralisée avec des démangeaisons ;
  - une coloration bleutée de la peau ou une pâleur ;
  - une fièvre ou des frissons.

 **J'APPELLE IMMÉDIATEMENT LE 15**

## J'agis

- S'il y a un dard, je le retire rapidement avec  l'ongle ou  avec une carte de crédit (ne pas utiliser de pince à épiler) ;
- en cas de piqûre à la main, je lui retire  bagues et bracelets pour ne pas gêner la circulation du sang si un gonflement se développe ;
- je désinfecte  à l'eau et au savon, puis j'applique une solution antiseptique ;
- en cas de douleur intense, je lui donne  du paracétamol.

## Je surveille



Si la réaction locale s'aggrave dans les jours qui suivent la piqûre ou si des signes tels que de la fièvre et/ou des frissons se développent, **JE CONSULTE SANS TARDER MON MÉDECIN.**

## Je protège

Si mon enfant est allergique, je peux demander au médecin de me prescrire une trousse d'urgence. Je pense à informer l'entourage et ses amis de ce risque allergique.



- Pour mon enfant je privilégie les vêtements couvrants de couleurs claires et évite les parfums, les crèmes solaires odorantes, etc. ;



- j'évite de le laisser près de plantes à fruits, de ruches ou de nids d'insectes, de corbeilles de fruits, de restes de nourriture, etc. ;



- je prends garde à la présence de guêpes lorsque nous mangeons, j'évite par exemple de lui faire boire à l'extérieur des boissons en canette, etc. ;



- en présence d'insectes, j'évite les mouvements brusques. Mon enfant doit rester calme, je lui rappelle que les abeilles ne piquent que lorsqu'elles se sentent agressées ;



- j'évite que mon enfant marche pieds nus ou en sandales dans la nature (en particulier près d'un point d'eau ou dans l'herbe) ;



- je fais retirer les nids d'abeilles, de guêpes ou de frelons près de mon habitation dès que je les repère ;



- si une abeille ou une guêpe entre dans mon véhicule, je m'arrête calmement et ouvre les fenêtres.

Retrouvez  
+ d'infos et  
de conseils ici

